

紅姬緣椿象(*Leptocoris augur*)

文：陳政雄



春天聚集的紅姬緣椿象(1.7cm)
攝影：陳順其 地點：校門西方

椿象屬於半翅目的昆蟲，包括顯角亞目(陸生或兩棲椿象)及隱角亞目(水生椿象)。約 78 科，有 2 萬多種。台灣已知有 400 多種。

有些椿象會釋放臭氣，所以又稱為臭蟲。有些則不會釋放臭氣。



紅姬緣椿象(1.6cm)

攝影：黃國政
地點：科學館前

紅姬緣椿象生活史是屬於不完全變態(漸進變態)，它的成長過程是：卵 若蟲 成蟲，而若蟲要經過 5 次的脫皮才能變為成蟲。從卵孵化後到成蟲需要 40 天左右，成蟲的生命大概可維持 55 天。

紅姬緣椿象的體色為紅色，頭部有像鞭子狀的觸角，是牠的感覺器官，嘴巴像針一樣，可刺入樹幹中吸取樹汁，但平常時候摺起來收於腹部。成蟲時，身體長大約 13~16 cm，雌性的椿象體型比雄性大。有兩對翅，上翅和下翅，上翅膜質和革質內側是黑色，呈一個「V」字型。六隻腳的末端有爪和肉墊，可以讓紅姬緣椿象在樹上爬行或倒立。

紅姬緣椿象是相當常見的昆蟲，牠們主要的活動期是十二月到隔年的四月，成蟲或若蟲會聚集在一起吸豆科植物的汁液，特別是台灣欒樹，此時一棵樹可能巨集上千隻左右，也因此常常讓許多民眾相當困擾跟恐慌，不過儘管如此，牠對台灣欒樹的生長並不會有太大的影響。



紅姬緣椿象(1.1cm)

攝影：黃瑞棋
地點：藝術館旁